



## Børneorm

### Årsag

Børneorm skyldes infektion med en flercellet parasit (orm, helmint), som lever i tarmen hos mennesker

### Forekomst

Børneorm findes i hele verden også i Danmark.

### Smitteveje

Ormen lægger sine æg omkring endetarmens åbning om natten, og da det klør, får man æggene på fingrene, som kan føres til munden, eller findes på møbler og i husstøv, hvor de kan overføres til hænder og madvarer og dermed smitte videre. Æggene er meget modstandsdygtige og kan overleve i sengetøj og støv i et par uger.

### Symptomer

Kløe i endetarmen mest udtalt om natten. Ormene kan let ses på afføringen. De er ca. 1 cm lange, hvide og sytrådslignende.

### Behandling

Der findes medicin mod ormene (tabletter). Hele husstanden behandles samtidigt. Samtidig bør sengetøj og undertøj vaskes (minimum 60 grader).

### Forholdsregler

God håndhygiejne og korte negle hos barnet.

### Inkubationstid

2-6 uger, smitter fra 2 uger efter smitte til behandling er iværksat.

**Ved konstatering af børneorm kan barnet atter modtages i pasning, når behandling er iværksat.**

Kilder:

Statens Serum Institut, [www.ssi.dk](http://www.ssi.dk)

Sundhedsstyrelsen. Smitsomme sygdomme hos Børn, Vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre, 1996.

Den Kommunale Sundhedstjeneste 2010