



Febernedsettende medicin til børn.

Ved febernedsettende medicin forstås i denne sammenhæng smertestillende medicin f.eks. paracetamol.

Børn der måtte have brug for febernedsettende medicin, må ikke komme i pasning.

Børn bør generelt ikke få febernedsettende medicin, da det kan sløre barnets sygdomssymptomer. Er barnet alment påvirket med feber, bør det ikke have febernedsettende medicin, før det er blevet vurderet af en læge.

Nedenfor gengives forskellige offentlige instansers udmelding om brug af febernedsettende medicin til børn.

Sundhedsstyrelsen skriver i Sunde Børn, 2019 s. 113:

”Smerte- og febernedsettende medicin må ikke gives til børn under 2 år uden lægens anvisning”.

På **indlægssedler** på paracetamol står der: ”Du må ikke bruge Paracetamol til børn under 2 år uden lægens anvisning”.

Lægemiddelstyrelsen oplyser på deres hjemmeside at acetylsalicylsyre kan forårsage Reye’s syndrom hos børn. Reye’s syndrom er en meget sjælden sygdom, der påvirker hjerne og lever og kan være livstruende. Acetylsalicylsyre bør derfor ikke gives til børn under 16 år uden lægens anvisning.

Månedsskrift for praktisk lægegerning, december 2009, kan ikke anbefale at give paracetamol til børn efter vaccinationer, da det har vist, at børnene danner betydelig mindre antistoffer efter indgift af paracetamol.

Den Kommunale Sundhedstjeneste, 2020